

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2026**  
**ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ'Λ**

**ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Σχολ. Βιβλίο σελ. 133.

**A2** Σχολ. Βιβλίο σελ. 51.

**A3.** Σχολ. Βιβλίο σελ. 185.

**A4. (α)** Λάθος **(β)** Σωστό **(γ)** Σωστό **(δ)** Σωστό **(ε)** Λάθος

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων είναι τα  $D_f = (1, +\infty)$  και  $D_g = [2, +\infty)$  αντίστοιχα. Συνεπώς:

$$D_h = D_{f \circ g} = \begin{cases} x \in D_g \\ g(x) \in D_f \end{cases} \Leftrightarrow D_h = \begin{cases} x \geq 2 \\ \sqrt{x-2} + 1 > 1 \end{cases} \Leftrightarrow D_h = \begin{cases} x \geq 2 \\ \sqrt{x-2} > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow D_h = \begin{cases} x \geq 2 \\ x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow D_h = (2, +\infty).$$

$$h(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2\ln(\sqrt{x-2} + 1 - 1) = 2\ln(\sqrt{x-2}) = \ln(\sqrt{x-2})^2 = \ln(x-2).$$

**B2.** Η συνάρτηση  $h$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(2, +\infty)$ , με παράγωγο:

$$h'(x) = [\ln(x-2)]' = \frac{1}{x-2} \cdot (x-2)' = \frac{1}{x-2} > 0, \quad x \in (2, +\infty)$$

Η συνάρτηση  $h$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $(2, +\infty)$ , άρα και 1-1.

Το πεδίο ορισμού της  $h^{-1}(x)$  είναι το σύνολο τιμών της  $h(x)$ .

$$h((2, +\infty)) \stackrel{h\uparrow}{=} \left( \lim_{x \rightarrow 2} h(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) \right) = (-\infty, +\infty), \text{ αφού}$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow 2} \ln(x-2) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$$

$$\text{όπου } x-2 = u, \quad u_0 = \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x-2) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u = +\infty$$

$$\text{όπου } x-2 = u, \quad u_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2) = +\infty$$

Συνεπώς θα έχουμε:

$$h(x) = y \Leftrightarrow \ln(x-2) = y \stackrel{e^x \cdot 1^{-1}}{\Leftrightarrow} e^{\ln(x-2)} = e^y \Leftrightarrow x-2 = e^y \Leftrightarrow x = e^y + 2$$

Άρα ο τύπος της αντίστροφης είναι :  $h^{-1}(x) = e^x + 2, x \in \mathbb{R}$ .

**B3.** Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left[ \ln(x-2) \cdot \frac{2\ln(x-1)}{x-2} \right] \quad (1)$$

· όπου  $x-2 = t \Leftrightarrow x = 2+t$ , άρα  $t_0 = \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$

$$(1) \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\ln(2+t-1) \cdot \ln t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\ln(1+t) \cdot \ln t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\ln(1+t)}{t} \cdot \ln t \quad (2)$$

$$\cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\ln(1+t)}{t} \stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2}{1+t} \stackrel{\text{DLH}}{=} 2, \quad \text{άρα } (2) \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\ln(1+t)}{t} \cdot \ln t = 2 \cdot (-\infty) = -\infty$$

### ΘΕΜΑ Γ

$$f(x) = \frac{\kappa x^3 + \mu x}{x^2 + 1}, x \in \mathbb{R}.$$

**Γ1. i)** Εφόσον η  $f$  παρουσιάζει οριζόντια ασύμπτωτη στο  $+\infty$ , θα πρέπει  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ .

Έχουμε  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\kappa x^3 + \mu x}{x^2 + 1} = \ell$ . Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

$$- \text{ Αν } \kappa \neq 0, \text{ τότε θα ισχύει } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\kappa x^3 + \mu x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\kappa x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \kappa x = \begin{cases} +\infty, & \text{αν } \kappa > 0 \\ -\infty, & \text{αν } \kappa < 0 \end{cases},$$

οπότε σε κάθε περίπτωση έχουμε άτοπο αφού το όριο είναι ίσο με  $\ell \in \mathbb{R}$ .

$$- \text{ Αν } \kappa = 0, \text{ τότε πράγματι θα ισχύει } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\kappa x^3 + \mu x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu}{x} = 0.$$

Άρα  $\kappa = 0$ .

**ii)** Εφόσον η ευθεία  $y = x$ , εφάπτεται στην  $C_f$ , στο σημείο  $O(0,0)$ , τότε θα πρέπει

$$\text{να ισχύει } f'(0) = 1. \text{ Όπου } f(x) = \frac{\mu x}{x^2 + 1} \text{ και}$$

$$f'(x) = \frac{(\mu x)' \cdot (x^2 + 1) - \mu x \cdot (x^2 + 1)'}{x^2 + 1} = \frac{\mu \cdot (x^2 + 1) - 2\mu x^2}{x^2 + 1} = \frac{\mu - \mu x^2}{x^2 + 1}.$$




$$\text{Άρα } f'(0) = 1 \Leftrightarrow \frac{\mu - \mu \cdot 0^2}{0^2 + 1} = 1 \Leftrightarrow \mu = 1.$$

Γ2. Είναι  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

i) Για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , είναι  $f'(x) = \frac{1 - x^2}{x^2 + 1}$ . Συνεπώς:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - x^2}{x^2 + 1} = 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1 \text{ ή } x = 1 \text{ και}$$

$f'(x) > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$ . Το πρόσημο της  $f'$  και η μονοτονία της  $f$  φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
f'	-		+	-
f				

Η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα  $(-\infty, -1]$  και  $[1, +\infty)$ , ενώ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα  $[-1, 1]$ .

Στο  $x_1 = -1$  η  $f$  παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο με τιμή  $f(-1) = \frac{-1}{(-1)^2 + 1} = -\frac{1}{2}$ .

Στο  $x_2 = 1$  η  $f$  παρουσιάζει τοπικό μέγιστο με τιμή  $f(1) = \frac{1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2}$ .

ii) Έστω τα διαστήματα  $A_1 = (-\infty, -1)$ ,  $A_2 = [-1, 1]$  και  $A_3 = (1, +\infty)$ . Έχουμε:

$$f(A_1) = \left( \lim_{x \rightarrow -1} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right) = \left( -\frac{1}{2}, 0 \right),$$

$$\text{αφού } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \stackrel{f \text{ συν.}}{=} f(-1) = -\frac{1}{2} \text{ και } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$f(A_2) \stackrel{f \uparrow}{=} [f(-1), f(1)] = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right], \text{ αφού } f(1) = \frac{1}{2}.$$

$$f(A_3) \stackrel{f \downarrow}{=} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -1} f(x)\right) = \left(0, \frac{1}{2}\right), \text{ αφού } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\text{Άρα το σύνολο τιμών της } f \text{ είναι το } f(A) = f(A_1) \cup f(A_2) \cup f(A_3) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

Το πλήθος ριζών της εξίσωσης  $f(x) = \frac{1}{2} + \alpha^2$ , με  $\alpha \in \mathbb{R}$ , δεδομένου ότι  $\frac{1}{2} + \alpha^2 \geq \frac{1}{2}$ ,

θα είναι το εξής:

- Αν  $\alpha = 0$ , τότε η εξίσωση  $f(x) = \frac{1}{2}$  έχει 1 ρίζα μοναδική αφού  $\frac{1}{2} \in f(A_2)$ .
- Αν  $\alpha \neq 0$ , τότε η εξίσωση  $f(x) = \frac{1}{2} + \alpha^2$  έχει 0 ρίζες, αφού  $\frac{1}{2} + \alpha^2 \notin f(A)$ .

**Γ3.** i) Το ολοκλήρωμα για όπου  $n$  το  $n+1$  γίνεται:

$$I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^{2(n+1)+1}}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{2n+3}}{x^2+1} dx. \text{ Άρα:}$$

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{x^2+1} dx + \int_0^1 \frac{x^{2n+3}}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{2n+1} + x^{2n+3}}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}(1+x^2)}{x^2+1} dx =$$

$$\int_0^1 x^{2n+1} dx = \left[ \frac{x^{2n+2}}{2n+2} \right]_0^1 = \frac{1}{2n+2}.$$

ii) Από την σχέση του προηγούμενου ερωτήματος έχουμε:

$$\text{Για } n=0: I_0 = \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \left[ \ln(x^2+1) \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}$$

$$\text{Για } n=0, \text{ όμως } I_0 + I_1 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\ln 2}{2} + I_1 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow I_1 = \frac{1-\ln 2}{2}$$

$$\text{Για } n=1, \text{ όμως } I_1 + I_2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{1-\ln 2}{2} + I_2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow I_2 = \frac{1}{4} - \frac{2(1-\ln 2)}{4} = \frac{2\ln 2 - 1}{4}.$$

**ΘΕΜΑ Δ**

**Δ1.** Έστω συνάρτηση  $w(x) = g(x) + x$ .

Η  $w$  είναι συνεχής στο διάστημα  $[-1, 0]$  και

$$w(-1) = g(-1) - 1 < 0, \text{ αφού } 0 < g(x) < 1$$

$$w(0) = g(0) > 0$$

Άρα  $w(-1) \cdot w(0) < 0$ .

Επομένως από θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον  $x_1 \in (-1, 0)$  τέτοιο, ώστε:  $w(x_1) = 0$ , άρα  $g(x_1) + x_1 = 0$ .

Για την μοναδικότητα του  $x_1$ :

Είναι  $w'(x) = g'(x) + 1 \neq 0$ , αφού  $g'(x) \neq -1$ .

Άρα η  $w'$  δεν μηδενίζεται, άρα διατηρεί σταθερό πρόσημο.

Άρα η  $w'(x) > 0$  ή  $w'(x) < 0$ . Επομένως είναι γνησίως μονότονη.

Άρα το  $x_1$  είναι μοναδικό.

**Δ2.** Αφού είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0 = 0$ , θα πρέπει:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2(g(x) + x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2(g(x) + x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} [x(g(x) + x)] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\eta\mu x + \epsilon\phi x - \kappa x - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{2\eta\mu x}{x} + \frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} - \kappa \right) = 2 + 1 \cdot 1 - \kappa = 3 - \kappa.$$

Άρα πρέπει:  $3 - \kappa = 0$ . Επομένως  $\kappa = 3$ .

**Δ3. i)** Για  $x \in [0, \frac{\pi}{2})$  είναι:  $f'(x) = 2\sigma\upsilon\nu x + \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} - 3 = \frac{2\sigma\upsilon\nu^3 x + 1 - 3\sigma\upsilon\nu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$

Θέτουμε:  $\sigma\upsilon\nu x = y$ . Άρα:  $2y^3 - 3y^2 + 1$  με  $0 < y \leq 1$  και ρίζα το  $y = 1$ .

Κάνουμε σχήμα Horner

2	-3	0	1	1
	2	-1	-1	
2	-1	-1	0	

$$\text{Άρα: } 2y^3 - 3y^2 + 1 = (y-1)(y-1)\left(y + \frac{1}{2}\right) = (y-1)^2\left(y + \frac{1}{2}\right) \geq 0, \quad 0 < y \leq 1.$$

$$\text{Άρα: } f'(x) \geq 0. \text{ Επομένως η } f \text{ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα } \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{Με } x \geq 0, \text{ είναι } f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow f(x) \geq 0.$$

ii) Είναι:  $3f(x) = \pi \Leftrightarrow 3f(x) - \pi = 0.$

$$\text{Η } f \text{ είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής στο } \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{Άρα το σύνολο τιμών: } f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right)\right) = \left[f(0), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x)\right)$$

$$\text{Είναι: } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (2\eta\mu x + \epsilon\phi x - 3x) = 2 \cdot 1 + (+\infty) - \frac{3\pi}{2} = +\infty$$

$$\text{Επομένως: } f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right)\right) = \left[f(0), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x)\right) = \left[0, +\infty\right).$$

$$\text{Έστω } K(x) = 3f(x) - \pi. \text{ Με } K'(x) = 3f'(x) \geq 0.$$

$$\text{Η } K \text{ είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο } \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{Με σύνολο τιμών: } \left[K(0), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} K(x)\right) = \left[-\pi, +\infty\right) \text{ αφού:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} K(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (3f(x) - \pi) = 3(+\infty) - \pi = +\infty.$$

Το  $0 \in [-\pi, +\infty)$ . Άρα θα υπάρχει ένα τουλάχιστον  $x_2$  τέτοιο, ώστε  $f(x_2) = 0$  και λόγω της μονοτονίας της  $f$  θα είναι και μοναδικό.

**Δ4. i)** Είναι  $f(x) = x^2 \cdot w(x).$

Δείξαμε ότι η  $w$  είναι γνησίως μονότονη.

Είναι  $-1 < 0$  και είδαμε  $w(-1) < w(0)$ , άρα συμπεραίνουμε ότι η  $w$  είναι γνησίως αύξουσα. Είναι:  $x_1 \leq x \leq 0$  και αφού  $w$  είναι γνησίως αύξουσα

$$w(x_1) \leq w(x), \text{ άρα } w(x) \geq 0. \text{ Επομένως: } f(x) = x^2 \cdot w(x) \geq 0$$

$$\text{Άρα: } f(x) \geq 0.$$

ii) Έχουμε:

$$E = \int_{x_1}^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx, \text{ οπότε πρέπει } \int_{x_1}^0 f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx$$

$$\text{άρα } \int_{x_1}^0 x^2 (g(x) + x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2\eta\mu x + \varepsilon\phi x - 3x) dx$$

$$\text{Οπότε } \int_{x_1}^0 x^2 g(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2\eta\mu x + \varepsilon\phi x - 3x) dx - \int_{x_1}^0 x^3 dx \quad (1).$$

$$\text{Ισχύει } \int_{x_1}^0 x^3 \cdot g'(x) dx = \left[ x^3 g(x) \right]_{x_1}^0 - 3 \int_{x_1}^0 x^2 g(x) dx \stackrel{(1)}{=} -x_1^3 g(x_1) - 3 \left( \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2\eta\mu x + \varepsilon\phi x - 3x) dx - \int_{x_1}^0 x^3 dx \right)$$

$$\stackrel{g(x_1)=-x_1}{=} x_1^4 - 3 \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2\eta\mu x + \varepsilon\phi x - 3x) dx + 3 \int_{x_1}^0 x^3 dx \quad (2).$$

$$\text{Όμως } \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left( 2\eta\mu x + \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} - 3x \right) dx = \left[ -2\sigma\upsilon\nu x - \ln|\sigma\upsilon\nu x| - \frac{3x^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} =$$

$$\left( -2\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} - \ln \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} - \frac{3 \cdot \frac{\pi^2}{9}}{2} \right) - (-2 - \ln 1 - 0) = -2 \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{2} - \frac{\pi^2}{6} + 2 = 1 + \ln 2 - \frac{\pi^2}{6}$$

$$\text{και } \int_{x_1}^0 x^3 dx = \left[ \frac{x^4}{4} \right]_{x_1}^0 = -\frac{x_1^4}{4}.$$

$$\text{Άρα η (2): } x_1^4 - 3 \left( 1 + \ln 2 - \frac{\pi^2}{6} \right) + 3 \left( -\frac{x_1^4}{4} \right) = x_1^4 - 3 - 3 \ln 2 + \frac{\pi^2}{2} - 3 \frac{x_1^4}{4} =$$

$$\frac{x_1^4}{4} - 3 \ln 2 + \frac{\pi^2}{2} - 3.$$